

Rekomendācijas sagatavošanai narkozei ambulatori.

Izmeklējumu iespējams veikt vispārējā anestēzijā (narkozē).

Narkoze-īslaicīgs samaņas zudums, ko panāk ar hipnotisko un atsāpinošo vielu ievadīšanu intravenozi. Narkozes nodrošināšana var būt saistīta ar zināmu komplikāciju (sarežģījumu) iespējamību. To rašanas riska mazināšanai pirms plānveida izmeklējuma pacientiem ar hroniskām saslimšanām jāpanāk maksimāli iespējama veselības stāvokļa uzlabošanās (asinsspiediens individuālajās normas robežās, hroniskas slimības remisija (nav paasinājums), sirds ritma stabilizācija u.t.t.). Pretējā gadījumā manipulācija var būt atcelta.

Pierakstoties uz izmeklējumu jāinformē par slimošanu ar cukura diabētu (slimojoši ar cukura diabētu pacienti izmeklējami dienas 1. pusē).

Narkozes dienā pieļaujama sirds ritmu regulējošu medikamentu lietošana (piem. Concor, Betalok, Metoprolol), visi pārējie medikamenti ir jāatceļ iepriekšējā dienā traucētas medikamentu uzsūkšanas un mijiedarbības ar narkozes vielām dēļ. To lietošanu var atsākt dienā pēc narkozes.

Pacientiem 2 stundas pirms narkozes atļauts iedzert glāzi ūdens vai tējas bez piena un cukura. Uz izmeklējumu ar narkozi ir jāierodas ar pavadoni, kurš Jums palīdzēs nokļūt līdz mājām, jo iespējams īslaicīgs reibonis, nespēka epizodes vai līdzsvara traucējumi. Pēc narkozes diennakti nedrīkst vadīt mašīnu, veikt darbus saistītus ar precizitāti un pieņemt atbildīgus lēmumus.